



Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»

295007 Республика Крым, г. Симферополь,
проспект Академика Вернадского, 4

Отдел интеллектуальной собственности

Начальник отдела:
Бондаренко Даниил Владимирович
Тел. раб. +7(3652)51 08 69
Тел. моб. +7(978) 618 63 17
[E-mail:work.daniil@mail.ru](mailto:work.daniil@mail.ru)

г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20, каб. 308

**КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО**



*Отдел интеллектуальной
собственности*

**МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ № 5**

2023 г.

Патент на изобретение № 2809913

Авторы:

**Гривенко Сергей Геннадиевич,
Ильченко Федор Николаевич,
Фоломеева Лариса Игоревна,
Усманова Тамила Эскандеровна,
Семенов Юрий Александрович**

Способ профилактики раневых послеоперационных осложнений аллогерниопластики передней брюшной стенки

Изобретение относится к области медицины, а точнее к хирургии и может быть использовано для профилактики раневых осложнений после аллогерниопластики, при хирургическом лечении грыж передней брюшной стенки. Технической задачей изобретения является уменьшение раневых осложнений после герниопластики вентральных грыж эндопротезированием путем ускорения приживления сетчатого имплантата в ранние сроки после операции.

Поставленная задача решается тем, что способ профилактики раневых послеоперационных осложнений аллогерниопластики передней брюшной стенки, включающий применение препаратов, содержащих диосмин и

гиспередин по следующей схеме: на 2 сутки послеоперационного периода назначают по 2 таблетки (1000 мг) два раза в сутки при отсутствии тошноты, с третьих суток по 2 таблетки (1000 мг) три раза в сутки в течение 4-х дней, в дальнейшем - по 2 таблетки (1000 мг) два раза в сутки на течение 3-х дней, и по 2 таблетки (1000 мг) один раз в сутки в течение последующих 7 дней, до полного заживления послеоперационной раны и снятия швов, дополнительно включают в комплекс лечебных мероприятий тиотриазолин с первых суток послеоперационного периода. Последний применяют внутримышечно, по 0,05 ампулы 5 мл 1% или 2 мл 2,5% раствора. Общий курс лечения составляет 4-5 дней.

Формула изобретения

Способ профилактики раневых послеоперационных осложнений аллогерниопластики передней брюшной стенки, включающий применение препаратов, содержащих диосмин и гиспередин по следующей схеме: на 2 сутки послеоперационного периода назначают по 2 таблетки - 1000 мг два раза в сутки при отсутствии тошноты, с третьих суток по 2 таблетки

- 1000 мг три раза в сутки в течение 4 дней, в дальнейшем - по 2 таблетки - 1000 мг два раза в сутки на течение 3 дней и по 2 таблетки - 1000 мг один раз в сутки в течение последующих 7 дней, до полного заживления послеоперационной раны и снятия швов, отличающийся тем, что дополнительно включают в комплекс лечебных мероприятий тиотриазолин с первых суток послеоперационного периода, применяют внутримышечно по 0,05 ампулы 5 мл 1% или 2 мл 2,5% раствора, при этом общий курс лечения составляет 4-5 дней.